

1 Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL SN	RL D	FFH-RL	BNat-SchG	Pot. Vor- kommen im UR	Vor- kommen im UR	Beeinträch- tigung durch Vorhaben möglich	Ausschlussgründe für die Art
Säugetiere - Fledermäuse									
<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsfledermaus	2	2	II, IV	sg	x	-	x	-
<i>Eptesicus nilssonii</i>	Nordfledermaus	2	G	IV	sg	x	-	x	-
<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügelfledermaus	3	G	IV	sg	x	-	-	Keine Quartiere betroffen (Gebäudefledermaus), keine relevante Veränderung der Jagdhabitats, Bauarbeiten tagsüber
<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechsteinfledermaus	2	2	II, IV	sg	x	-	x	-
<i>Myotis brandtii</i>	Große Bartfledermaus	3	V	IV	sg	x	-	x	-
<i>Myotis daubentonii</i>	Wasserfledermaus	*	*	IV	sg	x	-	x	-
<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr	3	V	II, IV	sg	x	-	x	-
<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus	2	V	IV	sg	x	-	-	Keine Quartiere betroffen (Gebäudefledermaus), keine relevante Veränderung der Jagdhabitats, Bauarbeiten tagsüber
<i>Myotis nattereri</i>	Fransenfledermaus	V	*	IV	sg	x	-	x	-
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhautfledermaus	3	*	IV	sg	x	-	x	-
<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr	V	V	IV	sg	x	-	x	-
Amphibien									
<i>Hyla arborea</i>	Laubfrosch	3	3	IV	sg	x	-	-	Kein geeigneter Lebensraum betroffen
<i>Pelobates fuscus</i>	Knoblauchkröte	V	3	IV	sg	x	-	-	Kein geeigneter Lebensraum betroffen
<i>Pelophylax lessonae</i>	Kleiner Wasserfrosch	3	G	IV	sg	x	-	-	Kein geeigneter Lebensraum betroffen
<i>Rana arvalis</i>	Moorfrosch	V	3	IV	sg	x	-	x	-

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL SN	RL D	FFH-RL	BNat-SchG	Pot. Vor- kommen im UR	Vor- kom- men im UR	Beeinträch- tigung durch Vorhaben möglich	Ausschlussgründe für die Art
<i>Triturus cristatus</i>	Nördlicher Kammolch	2	V	II, IV	sg	x	-	-	Kein geeigneter Lebensraum betroffen
Reptilien									
<i>Coronella austriaca</i>	Glattnatter	2	3	IV	sg	x	-	x	-
<i>Lacerta agilis</i>	Zauneidechse	3	V	IV	sg	x	-	x	-
Schmetterlinge									
<i>Maculinea nausithous</i>	Dunkler Wiesenknopf- Ameisenbläuling	*	V	II, IV	sg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum betroffen
Libellen									
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	Östliche Moosjungfer	2	2	IV	sg	x	-	-	Kein geeigneter Lebensraum betroffen
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Große Moosjungfer	2	3	II, IV	sg	x	-	-	Kein geeigneter Lebensraum betroffen

Legende:

RL SN / D

1 = vom Aussterben bedroht

2 = stark gefährdet

3 = gefährdet

V = Vorwarnliste

G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes

* = ungefährdet oder nicht bewertet

FFH-RL

II = Art von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen

IV = Art von gemeinschaftlichem Interesse, die besonders zu schützen ist

BNatSchG

sg = streng geschützt

Fett gekennzeichneten Arten werden einer Art-für-Art-Prüfung unterzogen.

2 Relevanzprüfung für europäische Brutvogelarten

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL SN	RL D	VRL Anh. I	BNat-SchG	Pot. Vorkommen im UR	Vorkommen im UR	Beeinträchtigung durch Vorhaben möglich	Ausschlussgründe für die Art
<i>Turdus merula</i>	Amsel	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Falco subbuteo</i>	Baumfalke	3	3	-	sg	x	-	x	-
<i>Anthus trivialis</i>	Baumpieper	3	3	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine	1	1	-	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 500 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Merops apiaster</i>	Bienenfresser	R	2	-	sg	-	-	-	Kein Brutvogel im Vogtland [UNB V 20-2]
<i>Carduelis flammea</i>	Birkenzeisig	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Fulica atra</i>	Blässhuhn	*	*	-	bg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Parus caeruleus</i>	Blaumeise	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Carduelis cannabina</i>	Bluthänfling	V	3	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen	2	2	-	bg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht	*	*	-	bg	x	-	x	-
Coloeus monedula	Dohle	3	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel	3	*	X	sg	x	-	-	Keine geeigneten Nisthabitate betroffen, pot. Nahrungshabitate nicht essenziell
<i>Pica pica</i>	Elster	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Carduelis spinus</i>	Erlenzeisig	*	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL SN	RL D	VRL Anh. I	BNat-SchG	Pot. Vorkommen im UR	Vorkommen im UR	Beeinträchtigung durch Vorhaben möglich	Ausschlussgründe für die Art
<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	V	3	-	bg	x	-	-	Keine geeigneten Nisthabitate betroffen, pot. Nahrungshabitate nicht essenziell
<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	*	V	-	bg	x	-	x	-
<i>Loxia curvirostra</i>	Fichtenkreuzschnabel	*	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Pandion haliaetus</i>	Fischadler	R	3	X	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Fluchtdistanz 500 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	V	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Mergus merganser</i>	Gänsesäger	R	V	-	bg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Certhia brachydactyla</i>	Gartenbaumläufer	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Sylvia borin</i>	Gartengraszmücke	V	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz	3	V	-	bg	x	-	x	-
<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter	V	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Serinus serinus</i>	Girlitz	*	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	*	V	-	bg	x	-	x	-
<i>Pluvialis apricaria</i>	Goldregenpfeifer	n.b.	1	X	sg	x	-	-	In Sachsen nur Gastvogel, keine bedeutenden Rastflächen betroffen
<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper	*	V	-	bg	x	-	x	-
<i>Picus canus</i>	Grauspecht	*	2	X	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 400 m (vgl. [BMVBS 10])

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL SN	RL D	VRL Anh. I	BNat-SchG	Pot. Vorkommen im UR	Vorkommen im UR	Beeinträchtigung durch Vorhaben möglich	Ausschlussgründe für die Art
<i>Carduelis chloris</i>	Grünfink	*	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Picus viridis</i>	Grünspecht	*	*	-	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Accipiter gentilis</i>	Habicht	*	*	-	sg	x	-	x	-
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Passer domesticus</i>	Hausperling	V	V	-	bg	x	-	x	-
<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	3	V	X	sg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Cygnus olor</i>	Höckerschwan	*	*	-	bg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Columba oenas</i>	Hohltaube	*	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 500 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Kernbeißer	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Vanellus vanellus</i>	Kiebitz	1	2	-	sg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Sitta europaea</i>	Kleiber	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Dendrocopos minor</i>	Kleinspecht	*	V	-	bg	x	-	x	-
<i>Anas querquedula</i>	Knäkente	1	2	-	sg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Parus major</i>	Kohlmeise	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Corvus corax</i>	Kolkrabe	*	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße und nahe der Siedlungsbereiche unwahrscheinlich, da Fluchtdistanz 500 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran	V	*	-	bg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Circus cyaneus</i>	Kornweihe	1	1	X	sg	-	-	-	Kein Brutvogel im Vogtland [UNB V 20-2]
Anas crecca	Krickente	1	3	-	bg	x	-	x	-

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL SN	RL D	VRL Anh. I	BNat-SchG	Pot. Vorkommen im UR	Vorkommen im UR	Beeinträchtigung durch Vorhaben möglich	Ausschlussgründe für die Art
<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck	3	V	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 300 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Larus ridibundus</i>	Lachmöwe	V	*	-	bg	x	-	-	Keine geeigneten Nisthabitate betroffen, pot Nahrungshabitate nicht essenziell
<i>Apus apus</i>	Mauersegler	*	*	-	bg	x	-	-	Keine geeigneten Nisthabitate betroffen, pot Nahrungshabitate nicht essenziell
<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard	*	*	-	sg	x	-	x	-
<i>Delichon urbica</i>	Mehlschwalbe	3	3	-	bg	x	-	-	Keine geeigneten Nisthabitate betroffen, pot Nahrungshabitate nicht essenziell
<i>Falco columbarius</i>	Merlin	n.b.	n.b.	X	sg	x	-	-	In Sachsen nur Gastvogel, keine bedeutenden Rastflächen betroffen
<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	*	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nachtigall	*	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
Lanius collurio	Neuntöter	*	*	X	bg	x	-	x	-
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan	3	3	X	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Corvus corone corone</i>	Rabenkrähe	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Lanius excubitor</i>	Raubwürger	2	2	-	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 300 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe	3	3	-	bg	x	-	-	Keine geeigneten Nisthabitate betroffen, pot Nahrungshabitate nicht essenziell
<i>Aegolius funereus</i>	Rauhfußkauz	*	*	X	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da hohe Lärmempfindlichkeit (vgl. [BMVBS 10])

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL SN	RL D	VRL Anh. I	BNat-SchG	Pot. Vorkommen im UR	Vorkommen im UR	Beeinträchtigung durch Vorhaben möglich	Ausschlussgründe für die Art
<i>Aythya fuligula</i>	Reiherente	*	*	-	bg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Rohrhammer	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Circus aeruginosus</i>	Rohrweihe	*	*	X	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße und nahe der Siedlungsbereiche unwahrscheinlich, da Fluchtdistanz 300 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Milvus milvus</i>	Rotmilan	*	V	X	sg	x	-	x	-
Corvus frugilegus	Saatkrähe	2	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Schilfrohrsänger	3	*	-	sg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Aegithalos caudatus</i>	Schwanzmeise	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Saxicola torquata</i>	Schwarzkehlchen	*	*	-	bg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Milvus migrans</i>	Schwarzmilan	*	*	X	sg	x	-	x	-
<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	*	*	X	sg	-	x	x	-
<i>Ciconia nigra</i>	Schwarzstorch	V	*	X	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Brut nur in störungsarmen Waldgebieten und Fluchtdistanz 500 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Seeadler	V	*	X	sg	-	-	-	Kein Brutvogel im Vogtland [UNB V 20-2]
<i>Egretta alba</i>	Silberreiher	n.b.	n.b.	X	sg	x	-	-	In Sachsen nur Gastvogel, keine bedeutenden Rastflächen betroffen
<i>Turdus philomelos</i>	Singdrossel	*	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Accipiter nisus</i>	Sperber	*	*	-	sg	x	-	x	-

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL SN	RL D	VRL Anh. I	BNat-SchG	Pot. Vorkommen im UR	Vorkommen im UR	Beeinträchtigung durch Vorhaben möglich	Ausschlussgründe für die Art
<i>Glaucidium passerinum</i>	Sperlingskauz	*	*	X	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da mittlere Lärmempfindlichkeit und Effektdistanz 500 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Sturnus vulgaris</i>	Star	*	3	-	bg	x	-	x	-
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer	1	1	-	bg	-	-	x	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Carduelis carduelis</i>	Stieglitz	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Anas platyrhynchos</i>	Stockente	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Parus palustris</i>	Sumpfmeise	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Tannenhäher	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Gallinula chloropus</i>	Teichralle (Teichhuhn)	V	V	-	sg	x	-	x	-
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Trauerschnäpper	V	3	-	bg	x	-	x	-
<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke	*	*	-	sg	x	-	-	Keine geeigneten Nisthabitate betroffen, pot Nahrungshabitate nicht essenziell
<i>Streptopelia turtur</i>	Turteltaube	3	2	-	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da mittlere Lärmempfindlichkeit und Effektdistanz 500 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Turdus pilaris</i>	Wacholderdrossel	*	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel	*	V	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da hohe Lärmempfindlichkeit (vgl. [BMVBS 10])
<i>Certhia familiaris</i>	Waldbaumläufer	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Strix aluco</i>	Waldkauz	*	*	-	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da mittlere Lärmempfindlichkeit und Effektdistanz 500 m (vgl. [BMVBS 10])

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL SN	RL D	VRL Anh. I	BNat-SchG	Pot. Vorkommen im UR	Vorkommen im UR	Beeinträchtigung durch Vorhaben möglich	Ausschlussgründe für die Art
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Waldlaubsänger	V	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Asio otus</i>	Waldohreule	*	*	-	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da mittlere Lärmempfindlichkeit und Effektdistanz 500 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Falco peregrinus</i>	Wanderfalke	3	*	X	sg	x	-	-	Keine geeigneten Nisthabitate betroffen, pot Nahrungshabitate nicht essenziell
<i>Cinclus cinclus</i>	Wasseramsel	V	*	-	bg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Rallus aquaticus</i>	Wasserralle	V	V	-	bg	x	-	x	-
<i>Parus montanus</i>	Weidenmeise	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch	V	3	X	sg	x	-	-	Keine geeigneten Nisthabitate betroffen, pot Nahrungshabitate nicht essenziell
<i>Jynx torquilla</i>	Wendehals	3	2	-	sg	x	-	x	-
<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	V	3	X	sg	x	-	x	-
<i>Upupa epops</i>	Wiedehopf	2	3	-	sg	-	-	-	Kein geeigneter Lebensraum
<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper	2	2	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Motacilla flava</i>	Wiesenschafstelze (Schafstelze)	V	*	-	bg	-	-	-	Kein Brutvogel im Vogtland [UNB V 20-2]
<i>Circus pygargus</i>	Wiesenweihe	2	2	X	sg	x	-	-	Brut entlang der Straße und nahe der Siedlungsbereiche unwahrscheinlich, da Fluchtdistanz 300 m (vgl. [BMVBS 10])
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig	*	*	-	bg	x	-	x	-
<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp	*	*	-	bg	x	-	-	Brut entlang der Straße unwahrscheinlich, da Effektdistanz 200 m (vgl. [BMVBS 10])

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL SN	RL D	VRL Anh. I	BNat-SchG	Pot. Vorkommen im UR	Vorkommen im UR	Beeinträchtigung durch Vorhaben möglich	Ausschlussgründe für die Art
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Zwergschnepfe	n.b.	n.b.	-	sg	x	-	-	In Sachsen nur Gastvogel, keine bedeutenden Rastflächen betroffen
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zwergtaucher	V	*	-	bg	x	-	x	-

Legende:

RL SN / D

1 = vom Aussterben bedroht

2 = stark gefährdet

3 = gefährdet

n.b. = nicht bewertet

VRL Anh. I

X = Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, für die besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen

BNatSchG

sg = streng geschützt

V = Vorwarnliste

R = extrem selten

* = ungefährdet oder nicht bewertet

bg = besonders geschützt

Grün hinterlegte Arten sind in Sachsen häufige Arten.**Fett** gekennzeichneten Arten werden einer Art-für-Art-Prüfung unterzogen.