

Abschichtung nicht planungsrelevanter europäischer Vogelarten (Schritt A)

grau markiert: keine weitere Untersuchung auf Planungsrelevanz in Schritt B

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	Jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumansprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Glattfuß- und Raufußhühner – Phasianidae									
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	A	2	J	0	X	X		
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	A	2	J	2				
Haselhuhn	<i>Bonasa bonasia</i>	A	0	J	1				
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	A	3	J	2				
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	A	4	Z	V				
Entenverwandte – Anatidae									
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	A	4	JZW	*				
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	A		zW					
Zwergschwan	<i>Cygnus columbianus</i>	A		A				Ausnahme*	
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	A		ZW		X			
Zwerggans	<i>Anser erythropus</i>	A		A	0	X	Ausnahme*	Ausnahme*	
Bläßgans	<i>Anser albifrons</i>	A		ZW		X			
Graugans	<i>Anser anser</i>	A	2	JZ	*				
Weißwangengans	<i>Branta leucotis</i>	A		A		X		X	
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	A	2	Zw	R	X			
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	A	2	Zw	*				
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	A		Zw					
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	4	JZW	*				
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	A	2	Zw	*				
Spießente	<i>Anas acuta</i>	A	-1	ZW					
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	A	2	Z	2				
Krickente	<i>Anas crecca</i>	A	2	JZW	1				

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumsprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	A	2	Z	R				
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	A	3	JZW	*				
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	A	0	z	0		Ausnahme*		
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	A	4	JZW	*				
Bergente	<i>Aythya marila</i>	A		zw		X			
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	A		zw		X			
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	A		zw		X			
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	A		zw		X			
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	A		zw		X			
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	A	2	Zw	R				
Zwergsäger	<i>Mergus albellus</i>	A		zw					
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	A		Zw					
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	A	0	ZW					
Seetaucher – Gaviidae									
Sterntaucher	<i>Gavia stellata</i>	A		z					
Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	A		zw					
Lappentaucher – Podicipedidae									
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	A	4	JZw	*				
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	A	1	Zw	R				
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	A	4	JZw	*				
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	A	0	z					
Schwarzhals-taucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	A	2	z	V				
Störche – Ciconiidae									
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	A	3	Z	*				
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	A	3	Z	1				
Ardeidae – Reiher									
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	A	1	zw	1				

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumsansprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	A	1	z	0		Ausnahme*		
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	A		zw					
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	A	4	JZW	*				
Kormorane – Phalacrocoracidae									
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	A	3	JZW	R				
Falken – Falconidae									
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	A	2	Jzw	*				
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	A		zw					
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	A	3	Z	*				
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	A	4	JZW	*				
Habichtartige – Accipitridae									
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	A	(1)	Z	0		Ausnahme*		
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	A	3	Z	*				
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	A		z					
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	A	4	JZw	3				
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	A	4	Z	*				
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A		zw	R	X			
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	A	4	JZW	*				
Rauhfußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	A		zW					
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	A	4	JZW	*				
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	A	4	JZW	*				
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	A	3	Z	*				
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	A	(1)	ZW	0		Ausnahme*		
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	A	(1)	Z	1				
Rallen - Rallidae									
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	A	3	JZw	*				

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumsansprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	A	3	Z	2				
Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	A	(1)	z	0		Ausnahme*		
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	A	1	Z	1				
Zwergsumpfhuhn	<i>Pusilla pusilla</i>								
Teichhuhn/Teichralle	<i>Gallinula chloropus</i>	A	3	JZw	V				
Bläßhuhn/Bleßralle	<i>Fulica atra</i>	A	4	JZW	*				
Kraniche - Gruidae									
Kranich	<i>Grus grus</i>	A		Zw	R				
Austernfischer - Haematopodidae									
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	A		z		X			
Stelzenläufer - Recurvirostridae									
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	A		z					
Regenpfeiferverwandte - Charadriidae									
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	A		Z					
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	A		z					
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	A	3	Z	1				
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	A	(1)	Z					
Flußregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	A	3	Z	*				
Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	A		a				Ausnahme*	
Schnepfenvögel - Scolopacidae									
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	A		Z					
Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	A		z		X			
Knutt	<i>Calidris canutus</i>	A		z		X			
Sanderling	<i>Calidris alba</i>	A		z		X			
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	A		Z					
Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	A		Z					

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumsansprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	A		Z					
Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	A		Z					
Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	A		z					
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	A	1	JZw	0		X		
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	A	(1)	z	0		Ausnahme*		
Pfuhschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	A		z					
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	A	3	JZw	*				
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	A		Zw					
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	A	3	Zw	1				
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	A		Z					
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	A	(1)	Z		X			
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	A		z					
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	A		Z					
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	A	(1)	Zw					
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	A		Z					
Flußuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	(1)	Z	0		X		
Möwen – Laridae									
Zwergmöwe	<i>Larus minutus</i>	A		z					
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	A	3	JZw	1				
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	A	(1)	z					
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	A	(1)	ZW	R				
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	A		zw		X			
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	A	(1)	ZW					
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	A		zw					
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	A		Zw					
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	A		zw					
Raubseeschwalbe	<i>Sterna caspia</i>	A		z		X			
Flußseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	A		z					

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumsprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A		z					
Trauersee-schwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	A	0	Z					
Tauben - Columbidae									
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	A	3	Z	*				
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	A	4	JZw	*				X
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	A	3	Z	V				
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	A	4	J	*				
Kuckucke – Cuculidae									
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	A	4	Z	V				
Schleiereulen - Tytonidae									
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	A	4	J	3				
Eulen - Strigidae									
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	A	4	JZW	*				
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	A	1	zw	0	X	X		
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	A	3	J	V				
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	A	4	J	*				
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	3	J	*				
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	A	2	J	1				
Rauhfußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	A	3	J	V				
Nachtschwalben - Caprimulgidae									
Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2	Z	1				
Segler – Apodidae									
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	A	4	Z	*				
Eisvögel – Alcedinidae									
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	A	3	J	*				
Spinte - Meropidae									
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	A	(1)	A	R			X	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumsprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Wiedehopfe - Upupidae									
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	A	1	z	0		X		
Spechte – Picidae									
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	A	3	Z	2				
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	A	4	J	*				
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	A	3	J	*				
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	A	4	J	*				
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	A	4	J	*				
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	A	3	J	V				
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	A	4	Jz	*				
Würger – Laniidae									
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	A	4	Z	*				
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	A	3	Jzw	1				
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>				0		X		
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>				0		X		
Pirole – Oriolidae									
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	A	4	Z	*				
Krähen – Corvidae									
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	A	4	JZw	*				
Elster	<i>Pica pica</i>	A	4	J	*				
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	A	3	JZ	*				
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	A	3	JZW	3				
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	A	1	ZW	1				
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	A	4	J	*				
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	A	(1)	zw					
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	A	4	J	*				
Seidenschwänze – Bombycillidae									
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	A		ZW					

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumsprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Meisen – Paridae									
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	A	4	JZW	*				X
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	A	4	JZW	*				X
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	A	4	JZw	*				X
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	A	3	J	*				
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	A	4	J	*				
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	A	4	J	*				
Beutelmeisen – Remizidae									
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	A	3	Z	V				
Schwalben – Hirundinidae									
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	A	3	Z	*				
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	A	4	Z	*				
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	A	4	Z	V				
Schwanzmeisen – Aegithalidae									
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	4	JZW	*				
Lerchen – Alaudidae									
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	A	3	J	1				
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	A	V	Z	V				
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	A	4	JZw	V				
Grasmücken – Sylviidae									
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	3	Z	*				
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	Z	*				
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	A	4	Z	*				
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	3	Z	*				
Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	A		z					
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	Z	3				

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumsprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A	4	Z	*				
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	4	Z	*				
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	A	4	Z	3				
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	4	Z	*				
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	4	Z	*				
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	4	Z	*				
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	4	Z	*				X
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	A	4	Z	*				X
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	A	3	z	3				
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	A	4	Z	*				
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	A	4	Z	*				
Timalien – Timaliidae									
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	A	2	Jzw	R				
Goldhähnchen – Regulidae									
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	A	4	JZW	*				
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	A	4	Z	*				X
Zaunkönige – Troglodytidae									
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	4	JZw	*				X
Kleiber – Sittidae									
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	A	4	J	*				
Baumläufer – Certhiidae									
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	A	4	J	*				
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	A	4	J	*				
Stare – Sturnidae									
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	4	Zw	*				
Drosseln – Turdidae									

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumsprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	A	(1)	z		X			
Amsel	<i>Turdus merula</i>	A	4	JZW	*				X
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	A	4	JZW	*				
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	A		Zw					
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	A	4	Z	*				X
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	A	4	Zw	*				
Schnäpperverwandte – Muscipapidae									
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	A	4	JZw	*				X
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	A	3	Z	*				
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	A		A				X	
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	A	3	Z	*				
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A	4	Zw	*				
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	4	Z	V				
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	A	4	Z	2				
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola [torquatus] rubicola</i>	A	2	z	*				
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	2	Z	1				
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	A	4	Z	*				
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	4	Z	3				
Halsband-schnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	A	(1)	z	0		X		
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	A	2	z	R				
Wasseramseln – Cinclidae									
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	A	3	J	*				
Sperlingsverwandte – Passeridae									
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	A	4	J	*				
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	A	4	J	*				
Braunellen – Prunellidae									
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	A	4	Zw	*				

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumsprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Stelzen – Motacillidae									
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla [flava] flava</i>	A	3	Z	3				
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	A	3	Zw	*				
Bachstelze	<i>Motacilla [alba] alba</i>	A	4	Zw	*				
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	A	1	z	1				
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	A	3	Zw	3				
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	A	4	Z	*				
Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	A		z		X			
Wasserpieper/ Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	A		zw					
Finken – Fringillidae									
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	A	4	JZw	*				X
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	A		Zw					
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	A	4	Z	*				
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	A	4	J	*				X
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	A	3	JZW	*				
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	A	4	JZw	*				
Birkenzeisig	<i>Carduelis [flammea] flammea</i>	A		zw	*				
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	A	4	JZw	*				
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	z	R				
Fichtenkreuz- schnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	A	3	JZW	*				
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	3	JZW	*				
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	4	JZW	*				
Ammern - Emberizidae									
Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	A	3	J	V				
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	A	4	JZW	*				X
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	A	(1)		0	X	Ausnahme*		

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Artstatus TH				Abschichtung als nicht planungsrelevant, weil...			
		Kategorie	Brutstatus	Jahreszeitlicher Status	RLT	vom Wirkraum abweichende Lebensraumsprüche	keine aktuellen Vorkommen in Thüringen (RLT = 0)	in Thüringen nur als Irrgast vorkommend	häufige Brutvogelart
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	A	1	z	0		Ausnahme*		
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	A	4	Zw	*				
Zaunammer	<i>Emberiza cirlus</i>				0		X		
Trappen - Otididae									
Großtrappe	<i>Otis tarda</i>				0		X		

Statusangaben zur Artenliste:

Kategorie (nach Rost & Grimm, 2004)

- A Die Art wurde vor und nach dem 1.1.1950 oder nach dem 1.1.1950 als Wildvogel in Thüringen festgestellt.
- B Die Art wurde lediglich vor 1950 in Thüringen als Wildvogel nachgewiesen.
- C Neozoen (eingebürgert oder eingewandert), die regelmäßig nachgewiesen werden.

Brutstatus (nach Rost & Grimm, 2004)

- 0 Ehemaliger Brutvogel, seit 1950 kein Brutnachweis.
- 1 War vor 1950 zumindest zeitweilig regelmäßiger Brutvogel, ist nach 1950 entweder verschwunden oder unregelmäßiger Brutvogel in wenigen Paaren.
- (1) Hat seit 1850 ausnahmsweise einmal oder mehrfach gebrütet, ist aber kein regelmäßiger Brutvogel.
- 2 Brütet jedes oder fast jedes Jahr, aber nur lokal und in sehr geringer Zahl.
- 3 Regelmäßiger Brutvogel, jedoch nur in bestimmten Regionen oder nur lokal in größeren Beständen.
- 4 Regelmäßiger Brutvogel in geeigneten Lebensräumen in weiten Teilen Thüringens.

Jahreszeitlicher Status (nach Rost & Grimm, 2004)

- J Jahresvogel; Brut- und Winterpopulation nicht immer identisch.
- Z/z Zugvogel und Durchzügler; der überwiegende Teil der Brutvögel verlässt Thüringen im Winter (Z), Brutvögel anderer Populationen ziehen häufig (Z) oder mit nur ausnahmsweise > 50 Individuen pro Jahr durch (z).
- W/w Wintergast; Vögel meist nordöstlicher Herkunft überwintern regelmäßig zumindest in einzelnen Landesteilen (W); Winterbestand mehr oder minder regelmäßig, aber nur ein Bruchteil der Sommerbestände (w).
- A/a Ausnahmeerscheinung; seit 1980 gab es in höchstens der Hälfte der Jahre Nachweise und dann nicht mehr als durchschnittlich 3 pro Jahr (A) oder es liegen seit 1950 maximal 5 Nachweise vor (a). Die Kennbuchstaben dieser Kategorie können auch kombiniert sein.



Rote Liste Thüringens (Frick et al., 2012)

0	ausgestorben oder verschollen
1	vom Aussterben bedroht
2	stark gefährdet
3	gefährdet
R	extrem selten
V	Vorwarnliste
*	ungefährdet

Ausnahme* = Ausnahmen bestehen aufgrund TLUG (Thüringer Landesamt für Umwelt und Geologie, 2013b):
Konzeption zur Erstellung einer Liste planungsrelevanter Vogelarten für die spezielle artenschutzrechtliche
Prüfung (saP) bei Planungs- und Zulassungsverfahren in Thüringen. – abrufbar unter: http://www.tlug-jena.de/imperia/md/content/tlug/abt3/2013_08_konzeption_planungsrelevante_vogelarten.pdf